

关于 Smarandache 双阶乘函数 $sdf(n)$ 的均值估计

樊旭辉, 闫欣荣

(武警工程大学理学院, 陕西西安, 710086)

摘要 对于任意正整数 n , Smarandache 双阶乘函数 $sdf(n)$ 定义为最小的正整数 m , 使得 $n \mid m !!$, 其中 $m !! = \begin{cases} 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots m, & 2 \nmid n \\ 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots m, & 2 \mid n \end{cases}$, 即 $sdf(n) = \min\{m: n \mid m !!, m \in N\}$ 。利用初等及解析方法研究 Smarandache 双阶乘函数 $sdf(n)$ 的均值估计, 得到一个关于函数 $sdf(n)$ 的均值估计的渐近公式。从而解决了 Felice Russo 在文献[4]中提出的问题。

关键词 Smarandache 双阶乘函数 $sdf(n)$, 均值估计; 渐近公式

DOI 10.3969/j.issn.1009-3516.2013.04.021

中图分类号 O156.4 **文献标志码** A **文章编号** 1009-3516(2013)04-0088-03

On the Mean Value of the Smarandache Double Factorial Function

FAN Xu-hui, YAN Xin-rong

(Science College, Engineering University of Armed Police Force, Xi'an 710086, China)

Abstract: For any positive integer n , the Smarandache double factorial is defined as the smallest integer such that $n \mid m !!$, where $m !! = \begin{cases} 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots m, & 2 \nmid n \\ 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots m, & 2 \mid n \end{cases}$. The paper conducts the study of the mean value of the Smarandache Double Factorial function by the elementary and analytic methods, obtains a sharper asymptotic formula for the Smarandache Double Factorial function, and thus solves the problem proposed by Felice Russo in reference [4].

Key words: Smarandache double factorial function; mean value; asymptotic formula

美籍罗马尼亚著名数论专家 F. Smarandache 教授在他所著的《Only Problems, Not Solutions》^[1] 一书中引入 Smarandache 双阶乘函数 $sdf(n)$, 对于任意正整数 n , Smarandache 双阶乘函数 $sdf(n)$ 定义为最小的正整数 m , 使得 $n \mid m !!$, 其中 $m !! = \begin{cases} 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots m, & 2 \nmid n \\ 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots m, & 2 \mid n \end{cases}$, 也就是 $sdf(n) = \min\{m: n \mid m !!, m \in N\}$ 。例如: $sdf(1) = 1, sdf(2) = 2, sdf(3) = 3, sdf(4) = 4, sdf(5) = 5, sdf(6) = 6, sdf(7) = 7, sdf(8) = 4 \cdots$ 。

关于 $sdf(n)$ 的性质, 有不少学者进行了研究, 得到了许多有重要理论价值的研究成果。例如,

Gao Jing 在文[2]中研究了 Smarandache 双阶乘函数 $sdf(n)$ 与 Mangoldt 函数 $\Lambda(n)$ 的混合均值问题, 证明了下面结论:

对于任意实数 $x \geq 2$, 有渐近公式:

$$\sum_{n \leq x} \Lambda(n) sdf(n) = x^2 \left(\frac{1}{2} + \sum_{m=1}^{k-1} \frac{a_m}{\log^m x} \right) + O\left(\frac{x^2}{\log^k x}\right)。$$

王晓瑛在文献[3]中讨论了 $sdf\left(\prod_{k=1}^m m_k\right)$ 和

$\sum_{k=1}^m sdf(m_k)$ 的关系, 证明了下面结论:

对于任意的正整数 $k \geq 4$, 存在无穷多个正整数

收稿日期: 2012-07-04

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(10671155); 陕西省自然科学基金资助项目(2011JM1019)

作者简介: 樊旭辉(1975—), 男, 陕西岐山人, 副教授, 主要从事数论及其应用研究。

E-mail: xuhuifan2050@163.com.

组 (m_1, m_2, \dots, m_k) 满足方程:

$$sdf\left(\prod_{i=1}^k m_i\right) = \sum_{i=1}^k sdf(m_i)$$

Felice Russo 在文献[4] 中对函数 $sdf(n)$ 进行了系统研究,得到了一些关于 $sdf(n)$ 的基本性质.同时, Felice Russo 在文献[4] 中提出了若干关于 $sdf(n)$ 的问题,并建议有兴趣的学者进行研究.

乐茂华在文献[5] 中应用初等方法对 $sdf(n)$ 进行了研究,得出了关于 $sdf(n)$ 的如下一些性质:

性质 1 设正整数 n 的标准分解式为 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$,若 $2 \nmid n$,那么:

$$sdf(n) = \max_{1 \leq i \leq k} \{sdf(p_i^{\alpha_i})\} \quad (1)$$

性质 2 如果 $2 \mid n$,且 $n = 2^\alpha n_1$,其中 α, n_1 为正整数且 $2 \nmid n_1$,那么:

$$sdf(n) \leq \max\{sdf(2^\alpha), 2sdf(n_1)\} \quad (2)$$

性质 3 设 m, n 为正整数,那么:

$$sdf(mm) \leq \begin{cases} sdf(m) + sdf(n), & 2 \mid m, 2 \mid n \\ sdf(m) + 2sdf(n), & 2 \mid m, 2 \nmid n \\ 2sdf(m) + 2sdf(n) - 1, & 2 \nmid m, 2 \nmid n \end{cases} \quad (3)$$

1 定理及推论

本文的主要目的是在 Felice Russo 和乐茂华等研究基础之上,利用初等和解析的方法研究 $sdf(n)$ 的均值估计问题,并给出了一个渐近公式.具体说就是证明了下面的结论:

定理 对于任意实数 $x \geq 2$,有渐近公式:

$$\sum_{n \leq x} sdf(n) = \frac{5\pi^2}{48} \frac{x^2}{\ln x} + \sum_{i=2}^k \frac{e_i x^2}{\ln^i x} + O\left(\frac{x^2}{\ln^{k+1} x}\right),$$

式中 e_i 为可计算的常数.

推论 对于任意正实数 $k < 2$,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{sdf(n)}{n^k}$

发散.

2 引理及其证明

为了完成定理的证明,需要如下的引理:

引理 1 对于任意的正整数 n ,如果 $P(n)$ 比 n 的最大素因子,那么有如下结论:

$$\text{当 } P(n) > \sqrt{n} \text{ 且 } 2 \nmid n \text{ 时, } sdf(n) = P(n) \quad (4)$$

$$\text{当 } P(n) > \sqrt{n} \text{ 且 } 2 \mid n \text{ 时, } sdf(n) = 2P(n) \quad (5)$$

$$\text{当 } P(n) < \sqrt{n} \text{ 时, } sdf(n) < 4\sqrt{n} \ln n \quad (6)$$

证明:首先,分 2 种情况讨论当 $P(n) > \sqrt{n}$ 时 $sdf(n)$ 的值:

1) 当 $P(n) > \sqrt{n}$ 且 $2 \nmid n$ 时,设 n 的标准分解式为 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k} \cdot P(n)$,其中 p_i 为小于 $P(n)$ 的奇素数, α_i 为正整数 ($i = 1, 2, \dots, k$).此时容易得

$p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k} < \sqrt{n}$,因此:

$$p_i^{\alpha_i} < \sqrt{n} \quad (i = 1, 2, \dots, k) \quad (7)$$

由式(1),有:

$$sdf(n) = \max_{1 \leq i \leq k} \{sdf(p_i^{\alpha_i}), sdf(P(n))\} \quad (8)$$

由 $sdf(n)$ 的定义并结合式(7),有:

$$sdf(p_i^{\alpha_i}) \leq p_i^{\alpha_i} < \sqrt{n} \quad (9)$$

由 $sdf(n)$ 及 $P(n)$ 的定义,有:

$$sdf(P(n)) = P(n) > \sqrt{n} \quad (10)$$

结合式(8)、(9)和(10),容易得:

$$sdf(n) = P(n)$$

2) 当 $P(n) > \sqrt{n}$ 且 $2 \mid n$ 时设 n 的标准分解式为 $n = 2^\alpha p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k} P(n)$,其中 p_i 为小于 $P(n)$ 的奇素数, β_i 为正整数 ($i = 1, 2, \dots, k$).

如果设 $n_1 = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k} \cdot P(n)$,那么 $n = 2^\alpha n_1$.由上述的讨论并结合式(2),有:

$$sdf(n) \leq \max\{sdf(2^\alpha), 2P(n)\} \quad (11)$$

由式(3),我们有:

$$sdf(2^\alpha) \leq 2\alpha \quad (12)$$

因为 $P(n) > \sqrt{n}$,所以 $2^\alpha < P(n)$,因此 $\alpha < P(n)$.由式(12),我们有:

$$sdf(2^\alpha) \leq 2\alpha < 2P(n) \quad (13)$$

结合式(11)、(12)和(13),有:

$$sdf(n) \leq 2P(n)$$

接下来证明此情况下 $sdf(n) = 2P(n)$.

当 $2 \mid n$ 时,设 $sdf(n) = 2m$, m 为正整数,由 $sdf(n)$ 的定义知 $n \mid (2m) !!$,即 $n \mid 2^m m !!$;

如果 $sdf(n) < 2P(n)$,那么就有 $n \mid 2^m \cdot m !!$ 且 $m < P(n)$,矛盾,因此 $sdf(n) = 2P(n)$.

最后,分 2 种情况讨论 $P(n) < \sqrt{n}$ 时 $sdf(n)$ 的值:

1) 当 $P(n) < \sqrt{n}$ 且 $2 \nmid n$ 时,设 n 的标准分解式为 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$,结合式(1)和(3),有:

$$sdf(n) = \max_{1 \leq i \leq k} \{sdf(p_i^{\alpha_i})\} \equiv$$

$$sdf(p^\alpha) \leq 2\alpha sdf(p) - 1 < 2\alpha p < 2\sqrt{n} \ln n \quad (14)$$

2) 当 $P(n) < \sqrt{n}$ 且 $2 \mid n$ 时,设 $n = 2^\alpha n_1$,其中 α 为正整数, n_1 为正整数且 $2 \nmid n_1$,由式(3),我们有:

$$sdf(2^\alpha) \leq \alpha sdf(2) = 2\alpha \leq \alpha \cdot P(n) < \sqrt{n} \ln n$$
$$2sdf(n_1) = 2 \max_{1 \leq i \leq k} \{sdf(p_i^{\alpha_i})\} \leq 4\alpha_i p_i - 2 < 4$$

$\sqrt{n} \ln n$.

结合以上两式及式(2),有:

$$sdf(n) < 4\sqrt{n} \ln n$$

于是完成了引理 1 的证明.

3 定理及推论的证明

将所有正整数分为 3 个集合 A, B 和 C :

$A = \{n: 1 \leq n \leq x, P(n) > \sqrt{n} \text{ 且 } 2 \nmid n\};$
 $B = \{n: 1 \leq n \leq x, P(n) > \sqrt{n} \text{ 且 } 2 \mid n\};$
 $C = \{n: 1 \leq n \leq x, P(n) \leq \sqrt{n}\}.$

因此,有:

$$\sum_{n \leq x} sdf(n) = \sum_{\substack{n \leq x \\ n \in A}} sdf(n) + \sum_{\substack{n \leq x \\ n \in B}} sdf(n) + \sum_{\substack{n \leq x \\ n \in C}} sdf(n) \quad (15)$$

由式(4),有:

$$\sum_{\substack{n \leq x \\ n \in A}} sdf(n) = \sum_{\substack{n \leq x \\ P(n) > n \\ 2 \nmid n}} sdf(n) = \sum_{\substack{pn \leq x \\ n < p \\ (2, n) = 1}} p \quad (16)$$

设 $sdf(n)$, 于是利用 Abel 求和公式(参阅文献[6]中定理 4.2)及素数定理(参阅文献[7]中定理 3.2):

$$\pi(x) = \sum_{p \leq x} 1 = \sum_{i=1}^k \frac{a_i x}{\ln^i x} + O\left(\frac{x}{\ln^{k+1} x}\right)$$

其中 $sdf[Z(n)]$ 为可计算的常数且 $Z[sdf(n)]$, 则有:

$$\sum_{n < p \leq \frac{x}{n}} p = \frac{x}{n} \pi\left(\frac{x}{n}\right) - n\pi(n) - \int_n^{\frac{x}{n}} \pi(t) dt = \frac{x^2}{2n^2 \ln x} + \sum_{i=2}^k \frac{b_i x^2 \ln^i n}{n^2 \ln^i x} + O\left(\frac{x^2}{n^2 \ln^{k+1} x}\right) \quad (17)$$

式中 $b_i (i = 2, 3, \dots, k)$ 为可计算的常数。

注意到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^i n}{n^2}$ 对所有的 $i = 1, 2, \dots, k$ 收敛。结合式(16)和(17)有:

$$\sum_{\substack{n \leq x \\ n \in A}} sdf(n) = \sum_{\substack{n \leq x \\ (2, n) = 1}} \left(\frac{x^2}{2n^2 \ln x} + \sum_{i=2}^k \frac{b_i x^2 \ln^i n}{n^2 \ln^i x} + O\left(\frac{x^2}{n^2 \ln^{k+1} x}\right) \right) = \frac{\pi^2}{16} \frac{x^2}{\ln x} + \sum_{i=2}^k \frac{c_i x^2}{\ln^i x} + O\left(\frac{x^2}{\ln^{k+1} x}\right) \quad (18)$$

式中 c_i 为可计算的常数。

类似地,注意到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^i n}{n^2}$ 对所有的 $i = 1, 2, \dots, k$ 收敛。由式(5),有:

$$\sum_{\substack{n \leq x \\ n \in B}} sdf(n) = \sum_{\substack{n \leq x \\ P(n) > n \\ 2 \mid n}} sdf(n) = \sum_{\substack{2pn \leq x \\ 2n < p}} \sum_{\substack{n \leq x/2 \\ 2n < p \leq \frac{x}{2n}}} 2p = \frac{\pi^2}{24} \frac{x^2}{\ln x} + \sum_{i=2}^k \frac{d_i x^2}{\ln^i x} + O\left(\frac{x^2}{\ln^{k+1} x}\right) \quad (19)$$

式中 d_i 为可计算的常数。

由式(6),有:

$$\sum_{\substack{n \leq x \\ n \in C}} sdf(n) < \sum_{n \leq x} 4\sqrt{n} \ln n \ll x^{3/2} \ln x \quad (20)$$

结合式(15)、(18)、(19)和(20),有:

$$\sum_{n \leq x} sdf(n) = \frac{5\pi^2}{48} \frac{x^2}{\ln x} + \sum_{i=2}^k \frac{e_i x^2}{\ln^i x} + O\left(\frac{x^2}{\ln^{k+1} x}\right)$$

式中 e_i 为可计算的常数。

于是完成了定理的证明。

推论的证明:

因为

$$\sum_{n \leq x} \frac{sdf(n)}{n^k} \leq \frac{\sum_{n \leq x} sdf(n)}{x^k} \quad (21)$$

结合定理及式(21),有:

$$\sum_{n \leq x} \frac{sdf(n)}{n^k} \leq \frac{\sum_{n \leq x} sdf(n)}{x^k} = \frac{5\pi^2}{48} \frac{x^{2-k}}{\ln x} + O\left(\frac{x^{2-k}}{\ln^2 x}\right) \quad (22)$$

由式(22),有:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{sdf(n)}{n^k} \leq \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5\pi^2}{48} \frac{x^{2-k}}{\ln x} + O\left(\frac{x^{2-k}}{\ln^2 x}\right) \right) = +\infty.$$

因此,对于任意正实数 $k < 2$,级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{sdf(n)}{n^k}$ 发散,即证明了推论。

4 结语

本文通过利用初等及解析的方法研究 Smarandache 双阶乘函数 $sdf(n)$ 的均值估计,得到一个关于函数 $sdf(n)$ 的均值估计的渐近公式。并在此基础上研究了级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{sdf(n)}{n^k}$ 的敛散性,得到正整数 $k < 2$,级数发散。当正整数 $k \geq 2$ 时,级数敛散性这个问题值得进一步研究。

参考文献(References):

- [1] Smarandache F. Only problems, not solutions [M]. Chicago: Xiquan publishing house,1993.
- [2] Gao Jing, Liu Huaning. On the mean value of smarandache double factorial function[J]. Smarandache notions journal,2004,14(1):193-195.
- [3] Wang Xiaoying. On certain equations involving the smarandache double factorial function [J]. Scientia magna,2008,4(1):56-59.
- [4] Felice Russo. A set of new Smarandache function, sequences and conjectures in number theory [M]. Lup-ton: American research press,2000.
- [5] Le Maohua. On the Smarandache double factorial function [J]. Smarandache notions journal,2002,13: 209-228.
- [6] Tom M Apostol. Introduction to analytic number theory [M]. New York: Spinger-verlag, 1976.
- [7] Pan Chendong, Pan Chenbiao. Elementary proof of the prime number theorem [M]. Shanghai: Shanghai science and technology press, 1988.

(编辑:徐楠楠)